

Способ применения и дозы

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Входящие в состав препарата молочнокислые бактерии поддерживают и восстанавливают физиологическое равновесие кишечной микрофлоры.

Бифидобактерии и лактобациллы, продуцируя молочную и уксусную кислоту, создают неблагоприятные условия для размножения и жизнедеятельности патогенных микроорганизмов; участвуют в процессе пищеварения и синтезе витаминов (В, К..), регулируют электролитный баланс, обмен белков, фосфолипидов, желчных и жирных кислот, билирубина, холестерина.

Естественные полисахариды - фруктоолигосахариды создают хорошую почву для размножения, колонизации и жизнедеятельности кишечных бактерий - эубиотиков.

Фруктоолигосахариды не расщепляются под действием пищеварительных кислот и в неизменном виде поступают в нижних отделах кишечника.

Показания к применению

- профилактика и лечение нарушения равновесия кишечной микрофлоры - дисбактериоза (синдром раздраженной кишки);
- дисбактериозы у детей и взрослых, возникающие во время лечения антибиотиками и химиотерапевтическими средствами;
- диарея, метеоризм, запоры;
- колиты, гастроэнтероколиты (острый и хронический).

Способ применения и дозы

Детям до 2 лет назначают содержимое одной капсулы смешенной с небольшим количеством жидкости (сок, подсахаренная вода), до приема пищи.

Детям 2-12 лет назначают по 1-2 капсулы в сутки до приема пищи, запивая небольшим количеством жидкости.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 2-3 капсулы в сутки натощак или до приема пищи, запивая небольшим количеством жидкости.

Длительность лечения зависит от причины развития дисбактериоза и индивидуальных особенностей организма.

Побочные действия

Препарат хорошо переносится, при применении препарата в рекомендуемых дозах побочные явления не отмечены.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Лекарственное взаимодействие

Не отмечено нежелательного взаимодействия Лакто-С Форте с другими лекарствами.

Особые указания

В период применения препарата не рекомендуется прием алкоголя.

Применение при беременности и в период лактации

Применение препарата при беременности и в период лактации считается безопасным.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Препарат не влияет на способность к концентрации внимания и на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами.

Передозировка

Данных о симптомах передозировки нет.

Форма выпуска

Капсулы, в упаковке 10 капсул.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Препарат нельзя использовать после истечения срока годности.